



Памятка для родителей о туберкулинодиагностике и направлении к фтизиатру.

В родильном доме вашему ребенку сделали прививку БЦЖ – от нее остался рубчик на левом плече. Теперь необходимо оценить напряженность поствакцинального иммунитета и своевременно провести профилактику туберкулеза-именно для этого нужна проба Манту, которую ПРЕДЛАГАЮТ В ДЕТСКОМ САДУ ЕЖЕГОДНО.

Многие ошибочно считают Р.Манту прививкой однако это не прививка, а кожная аллергическая проба, позволяющая определить напряженность иммунитета к туберкулезу и своевременно диагностировать заболевание у ребенка. Проба Манту проводится туберкулином-раствором осколков оболочек возбудителя туберкулеза(т.е.аллергеном,не вызывающим заболевания),который вводится в предплечье подкожно. Через три дня пробу измеряют.

При технически правильном внутрикожном введении туберкулина образуется «лимонная корочка»,а затем

при положительной реакции появляется папула, напоминающая внешне укус комара. У ребенка привитого вакциной БЦЖ, реакция Манту в первые 4-5 лет обычно стойко положительная (свыше 5 мм, но не более 17 мм) и постепенно угасающая. Это нормальное явление, т.н. поствакцинальная аллергия.

Отрицательная р. Манту у привитого ребенка означает неэффективную вакцинацию, и ребенку могут предложить повторную процедуру.

Если р. Манту нарастает более чем на 6 мм, или рядом появляются пузырьки, красная дорожка от пробы к локтю, или увеличиваются лимфоузлы, то это признаки т.н. выража туберкулиновых проб, т.е. инфицирования возбудителем туберкулеза. В подобных случаях ребенка обязательно направляют на консультацию к фтизиатру.

Фтизиатр выяснит, истинная это реакция или ложноположительная, обследует ребенка и, возможно назначит лечение.

Помните, что при отсутствии заключения фтизиатра в течение месяца после направления ребенка, не обследованного на туберкулез, не рекомендуется допускать в детский сад, т.к. он может стать источником инфекции в коллективе.

